

À la demande de l'ANSM, ce document est adressé par les laboratoires commercialisant un médicament à base de méthotrexate par voie orale aux pharmaciens d'officine afin d'informer les patients lors de chaque délivrance.

## Modalités de prise des comprimés de méthotrexate

**Il ne faut pas prendre ces comprimés tous les jours.  
Ce médicament doit être pris uniquement 1 jour par semaine.**



Plusieurs patients sous méthotrexate ont pris leurs comprimés tous les jours au lieu d'une seule fois par semaine. Ce type d'erreur est dangereux : il conduit à un surdosage qui peut provoquer des effets indésirables graves.

**Aussi, vous devez être vigilants et respecter strictement la prise sur 1 jour par semaine :** si ce n'est pas déjà fait, discutez avec votre médecin du jour qui vous convient le mieux et demandez à votre pharmacien de l'indiquer sur la boîte de votre médicament ou sur cette fiche. Pour éviter toute erreur sur le jour de prise, vous pouvez aussi reporter la date dans votre agenda ou sur un calendrier.

A remplir par votre pharmacien :

NOM du médicament prescrit : .....

Dose par semaine (mg)	Nombre de comprimé(s) par semaine en une prise unique

**Cochez le jour de prise des comprimés (et uniquement un jour par semaine) :**

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche

**Si vous avez pris plus de comprimés que vous n'auriez dû, contactez immédiatement votre médecin ou un service médical d'urgences (15).**

Un surdosage peut se traduire par un ou plusieurs des symptômes suivants : ecchymoses (bleus) ou saignements inexpliqués, fatigue inhabituelle, fièvre, plaies ou inflammation de la bouche, nausées, vomissements, diarrhées sévères, selles foncées ou sang dans les selles.

**Pour toute question ou pour plus d'informations, consultez la notice présente dans la boîte ou contactez votre médecin ou votre pharmacien.**